

Quels sont les risques ?

Les risques sont rares et le plus souvent, sans gravité.

Les plus fréquents sont :

- un saignement, un hématome ou une ecchymose (un « bleu ») au point de ponction,
- une réaction allergique lors de l'injection du produit de contraste.

Plus rarement :

- apparition ou aggravation d'une insuffisance rénale (presque toujours réversible),
- accident vasculaire cérébral ou AVC (0.1%),
- infarctus du myocarde (<0.1%),
- arrêt cardiaque (0.1%).

Pensez-y le jour de l'examen

- Munissez-vous, de la **liste des médicaments** que vous prenez à domicile et emportez les médicaments que vous devez prendre le jour de votre examen.
- Signalez à votre cardiologue ou à l'infirmière de l'hôpital de jour vos différents problèmes de santé ainsi que **vos allergies**.
- N'oubliez pas les documents et effets nécessaires à toute hospitalisation (carte d'identité, documents de mutuelle, nécessaire de toilette,...).
- N'emportez **aucun objet de valeur**.
- **Soyez A JEUN 6 à 8 heures** avant l'examen.
- Prévoyez de vous faire reconduire (!! un seul accompagnant à l'hôpital de jour !!)
- Prenez une douche et ôtez vos bijoux avant de vous présenter à l'hôpital.
- SURTOUT, **n'arrêtez pas votre traitement habituel** SAUF avis contraire de votre cardiologue (les anticoagulants type Asaflow®, Cardioaspirine®, Plavix® et Brilique® n'ont pas besoin d'être stoppés.)

Votre rendez-vous est prévu le :

.....
.....

à

Site :

Service :

**MERCI DE RESTER À
JEUN 6 À 8 HEURES AVANT L'EXAMEN**



La coronarographie : hôpital de jour

EpiCURA
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be

EpiCURA
mon hôpital

La coronarographie est un examen radiologique permettant de visualiser les artères coronaires. Un éventuel rétrécissement responsable par exemple, d'une insuffisance cardiaque, d'une angine de poitrine ou d'un infarctus du myocarde peut être ainsi visualisé et traité. Cet examen nécessite l'utilisation d'un produit de contraste. Ce produit à base d'IODE est amené jusqu'aux coronaires par de fins tuyaux introduits dans 90% des cas via l'artère du bras ou via l'artère fémorale située au niveau de l'aîne.

La préparation de l'examen

Cette intervention se déroule désormais en hôpital de jour, sur le site d'Hornu. Vous devez vous présenter le matin à JEUN et avec UN SEUL accompagnant à l'hôpital de jour de cardiologie situé au -1, après être passé par les Admissions entre 7h et 7h30 maximum. Lors de votre consultation chez le cardiologue, celui-ci vous a prescrit une prise de sang, il est indispensable de l'avoir faite avant le jour de l'examen.

Prenez une douche avant de vous présenter à l'hôpital. Retirez vos bijoux et vernis à ongles. Une infirmière vous prendra en charge et vous expliquera le déroulement de l'intervention en détail.

Avant l'examen, le personnel soignant prendra vos paramètres, effectuera un électrocardiogramme et vous serez préparé pour l'examen.

Afin d'optimiser votre prise en charge, nous vous remercions de bien vouloir compléter la feuille de médicaments ci-jointe.

Le déroulement de l'examen

Vous restez en général plus ou moins 1 heure dans la salle. L'examen proprement dit dure entre 15 et 35 minutes. Vous restez conscient(e) en permanence. Un relaxant peut vous être administré si nécessaire. Vous êtes installé(e) sur la table d'examen en position couchée sur le dos. Veillez à rester immobile. Les infirmières désinfectent le site de ponction. Après quoi, le médecin procède à une anesthésie locale. Ensuite, un cathéter est placé au niveau de l'artère radiale (ou fémorale). Un produit servant à dilater cette artère est alors injecté.

Une forte sensation de chaleur peut être ressentie dans la main et dans le bras mais elle disparaît au bout de quelques secondes. Le médecin est alors prêt à explorer les artères de votre cœur. À la fin de l'examen, le médecin enlève le cathéter puis, une infirmière place un bracelet compressif qui sera dégonflé régulièrement. Il restera en place entre 2 et 4 heures.



Après l'examen

Si la sonde a été introduite au niveau de l'aîne, vous resterez allongé dans votre lit la jambe bien tendue afin d'éviter tout risque de saignement ou d'hématome au niveau du point de ponction. Vous devrez être hospitalisé dans le service de cardiologie jusqu'au lendemain.

Si la sonde a été introduite au niveau du poignet, il faudra éviter d'utiliser la main dans laquelle le médecin a piqué jusqu'au lendemain (ne pas porter de poids, ne pas couper la viande, ne pas s'appuyer dessus, ...).

Dans tous les cas, dès que vous êtes sorti de la salle d'examen, vous pouvez manger et vous devez boire beaucoup d'eau afin d'éliminer le produit de contraste. Si vous ressentez une quelconque douleur, prévenez les infirmières qui s'occuperont de vous.

Nous enlèverons votre perfusion dès qu'il ne sera plus nécessaire de vous administrer des médicaments.

Les résultats de votre examen vous seront communiqués dès la sortie de la salle d'examen et le médecin passera vous voir par la suite pour vous expliquer votre traitement.

Les jours suivants

Vous pouvez prendre une douche dès le lendemain.

Durant quelques jours, soyez prudent dans vos mouvements afin d'éviter tout saignement ou hématome à l'endroit de la ponction : ne portez pas de charges trop lourdes et évitez toutes tâches salissantes (mécanique, jardinage, ...).