

La gestion de la douleur

En règle générale, la douleur survient très vite après le réveil. Elle est permanente et très forte lors de la déglutition. Elle peut durer jusqu'à 10 jours après l'opération. Le pédiatre prescrira des antidouleurs et des anti-inflammatoires.

Quand votre enfant peut-il recommencer à manger ?

Une heure après l'opération, le médecin décide si l'enfant est apte à boire et à manger.

Si l'avis est positif, l'infirmière lui donnera de l'eau et, ensuite, des crèmes froides ou glacées.

À la maison

Une fois de retour à la maison, nous vous demandons de bien vouloir suivre les conseils du médecin et d'appliquer les recommandations de l'infirmière. Cette dernière vous remettra un document récapitulatif.

Ne vous inquiétez pas si votre enfant

- présente de la fièvre les 2 premiers jours qui suivent l'opération (prévenez le médecin si elle persiste) ;
- ronfle, dégage une haleine désagréable ou si des peaux de couleur blanche apparaissent dans la gorge ;
- crache un caillot de sang (cela correspond à la chute d'une croûte).

Ne pas jeter sur la voie publique - Septembre 2022.



EpiCURA
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Editeur responsable : François Burhin - Rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

L'ablation des amygdales

EpiCURA
mon hôpital

Les amygdales se trouvent au fond de la gorge. Elles renferment des globules blancs qui jouent un rôle majeur dans la défense de l'organisme. Lorsque l'enfant respire, les amygdales forment une barrière contre les microbes et les détruisent.

Dans quels cas faut-il enlever les amygdales ?

- Difficultés à respirer si la taille des amygdales augmente ,
- angines à répétition ,
- amygdalites chroniques.

Le déroulement de l'opération

1. Quelques jours avant l'opération

- L'anesthésiste et le pédiatre, accompagné de l'infirmière, vous posent des questions sur votre enfant afin que l'intervention se déroule au mieux.
- Vous vous rendez ensuite au labo pour faire une prise de sang à l'enfant.

2. La veille de l'opération

- Veillez à ce que votre enfant reste à jeun, c'est-à-dire ne plus boire ni manger à partir de minuit.

3. Le jour de l'opération

- Procédez à l'admission de votre enfant au rez-de-chaussée (bureau admission).
- Rendez-vous ensuite à l'hôpital de jour pédiatrique au 2^e étage route 27. Votre enfant sera installé dans une chambre. Une infirmière prendra sa température et vérifiera qu'il est bien à jeun.



4. Avant l'entrée en salle d'opération

- L'infirmière enfile une blouse d'opéré à l'enfant et lui remet un bracelet d'identification.
- Votre enfant reçoit un médicament sous forme de suppositoire, gouttes ou sirop (prémédication) afin de l'apaiser. Il peut ensuite descendre en salle d'opération. Vous pouvez l'y accompagner jusqu'à l'ascenseur mais votre présence n'est pas autorisée en salle d'opération ni en salle de réveil. Notre personnel veillera sur lui en votre absence.

5. L'opération

- Dans la salle, l'anesthésiste endort votre enfant à l'aide d'un masque. Il ne ressentira aucune douleur.
- Une fois endormi, il reste sous surveillance grâce au monitoring.

6. Après l'opération

- L'enfant est transféré en salle de réveil. Le personnel lui administre des antidouleurs grâce à la perfusion.
- L'anesthésiste décide à quel moment il peut quitter la salle de réveil et revenir près de vous dans sa chambre.

Le retour en chambre

Ne vous inquiétez pas si votre enfant est encore un peu agité lorsqu'il regagne sa chambre. Il gardera la perfusion jusqu'à sa sortie de l'hôpital afin de lui administrer ses antidouleurs et d'autres médicaments si nécessaire. Il restera à l'hôpital de jour jusqu'à la fin de la journée.

Plusieurs conditions s'imposent pour que l'enfant puisse sortir de l'hôpital :

- qu'il soit complètement réveillé ;
- qu'il ait bu et qu'il ait mangé ;
- qu'il ait uriné ;
- que la douleur ait diminué ;
- qu'il n'ait plus de nausées ni de vomissements ;
- que le pédiatre ait marqué son accord.

Si ces conditions ne sont pas remplies, votre enfant sera transféré vers le service de pédiatrie du site d'Hornu jusqu'au lendemain.

